



Genesungsempfehlung

Liebe Eltern,

zum Wohle Ihres Kindes, aber auch zum Schutz der anderen Kinder und der Mitarbeitenden ist es uns sehr wichtig, dass Ihr Kind die Einrichtung nach einer Erkrankung gesund und ansteckungsfrei wieder besucht.

Als Orientierung, um eine verantwortliche Entscheidung treffen zu können, finden Sie hier die Wiedenzulassungstabelle nach Erkrankung. Diese Wiedenzulassungstabelle ist eine Empfehlung des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreises.

Wir bitten Sie, diese Empfehlungen zu berücksichtigen.

Herzlichen Dank,

Ihr Kita-Team

Wiederzulassungstabelle nach Erkrankung

in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises (Juli 2016)

Erkrankung	Wiederzulassung	Attest vom Arzt notwendig
bakteriellen Konjunktivitis (Bindehautentzündung)	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Std. nach Therapiebeginn • Bis zum Verschwinden des eitrigen Sekretes 	Nein BASISHYGIENE anwenden
Magen-Darm-Infektion	<ul style="list-style-type: none"> • erst 2 Tage nach dem Abklingen der klinischen Symptome 	Nein BASISHYGIENE anwenden (mind. 14 Tage lang!)
Chlamydien - Warzen („Schwimmbadkonjunktivitis“)	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort • nicht barfuß laufen, kein Schwimmunterricht 	Nein BASISHYGIENE anwenden
Streptococcus pyogenes- Infektionen z.B. eitrige Mandelentzündung	<ul style="list-style-type: none"> • Antibiotikatherapie und ohne Krankheitszeichen ab dem zweiten Tag, • ansonsten nach Abklingen der Krankheitssymptome 	Nein BASISHYGIENE anwenden
Saisonale Influenza Fiebrige Erkältung – grippaler Infekt	<ul style="list-style-type: none"> • Ansteckungsfähigkeit 4-5 Tage – bei Kindern ggf. länger • 24 Std. fieberfrei 	Nein BASISHYGIENE anwenden IMPFUNGEN!
Hepatitis B & D	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Kindern mit mangelnder Hygiene, Kindern mit aggressiven Verhaltensweisen, z.B. Beißen, Kratzen, immunsupprimierten Kindern sowie Kindern mit einer vermehrten Blutungsneigung oder entzündlichen Hautkrankheiten kann eine individuelle Entscheidung durch das Gesundheitsamt getroffen werden. 	Nein BASISHYGIENE anwenden IMPFUNGEN !
Herpes Zoster / Gürtelrose (Windpocken = Varizellen = IMPFUNGEN!)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 7 Tage nach Exanthembeginn, ansteckungsfähig. • 1 Woche nach Beginn einer unkomplizierten Erkrankung, d.h. mit dem vollständigen Verkrusten aller bläschenförmigen Effloreszenzen, 	Nein BASISHYGIENE anwenden